



Actividad: El medicamento aún puede afectar a su niño durante 24 horas. Si se siente somnoliento o parece estar completamente despierto, puede ser la falta de coordinación habitual. Su hijo necesita una cuidadosa atención para evitar caídas y accidentes.

Náuseas: El niño puede experimentar náuseas o vómitos de la anestesia. Si es así, por favor, sólo líquidos claros hasta la náusea se ha detenido.

Dieta: Su hijo puede ser dado líquidos claros (trozos de hielo, 7-up, Gatorade, Jell-O, o cualquier líquido que se puede ver a través de los primeros 1 o 2 horas. Si el niño no tiene problemas con las náuseas, a continuación, el/ella puede tener una comida ligera (sopa, helados, galletas, etc) deberían vomitar, volver al líquido claro muere. Una dieta blanda puede ser tolerado fácilmente para los primeros 1 ó 2 días. Si no hay náuseas o vómitos, su hijo puede comer alimentos sólidos gradualmente después de las primeras horas. Por favor, no permita que su hijo caramelos duros o pegajosos a partir de ahora, ya que esto puede dañar los dientes que fueron fijadas.

Dolor: es importante que su niño se mantenga cómodo durante el tiempo de cicatrización después de tratamiento dental. Ver a los niños que habitualmente se niegan a comer o beber cuando tienen graves dolor en la boca. El paracetamol o ibuprofeno medicamentos debe ser dada por las instrucciones que aparecen en el paquete. Evitar el uso de la aspirina.

Cuidado de la boca: es de vital importancia que los dientes se limpien durante las primeras etapas de curación. Recuerde la regla de las 3 's'. Los dientes deben ser cepillados tres veces al día durante tres minutos en un momento durante las tres primeras semanas después de tratamiento dental. Este cepillado debe ser realizado por un adulto ya que los niños se muestran muy reticentes a cepillarse los dientes correctamente. Utilice sólo un cepillo de cerdas suaves para cepillarse los dientes. Puede ser de ayuda para ejecutar agua tibia sobre el cepillo de dientes para ablandar las cerdas. Es normal observar una pequeña cantidad de sangrado después de cepillarse los dientes.

Lo que se puede esperar: es común que una pequeña cantidad de sangrado para continuar durante 2-3 horas tras las exodoncias o amplio tratamiento. Esta pequeña cantidad de sangre generalmente parece excesiva porque se mezcla con la saliva. Hay una cantidad anormal de sangrado, puede ser fácilmente controlado por paños húmedos y que su hijo pique. Presión de 10 a 15 minutos de sangrado leve. Es común que una fiebre baja durante las primeras 24 horas. El paracetamol o ibuprofeno medicamentos deben controlar la fiebre.

Cuándo llamar al dentista:

- * Ruido
- * dificultad para respirar o negarse a comer después de las primeras 12 horas después del tratamiento
- * vómitos persistentes
- * fiebre de más de 101F
- * sangrado excesivo
- * dolor persistente

Una vez que esté en casa y tiene alguna pregunta o preocupación, por favor llame a nuestra oficina al (812) 479-8609 o a mi teléfono celular (812) 459-6141.

Gracias,

Dr. Jeff Hiester